

# INSEKTSGNAG

Sture Hermansson

Naturen är full av intressanta varelser. En del är lätta att se medan andra är svårare att upptäcka. De vedlevande skalbaggnas larver är väl dolda och har ofta ett kort liv som fullbildade. Spåren efter dem bildar i stället fascinerande

mönster som är lätta att hitta, särskilt som barken ofta är bortplockad av en hackspett på jakt efter mat.

Fakta är hämtade ur Ehnström och Axelsson: *Insektsgnag i bark och ved.*



*En askgren från Vallby*

## Slät askbastborre

Gångarna efter den släta askbastborren finns i grenar av ask som är högst 3 cm i diameter.

Honan gräver en modergång tvärs emot fiberriktningen. Gången delar sig i två grenar som har formen av silhuetten av en flygande mås (på bilden är "måsen" uppochner). Modergångarna är ca 5 cm långa och 1,5 mm breda. Från modergången går många larvgångar ut vinkelrätt i ett vackert mönster. Larverna går ofta in ca 3 mm för förpuppning. Det är de många hålen på bilden.



*Gångar på en liggande död björk i Broby äng*



*En stående död björk vid Igeln*

## Björksplintborre

Lever i försvagade eller döda björkar. Honan gräver en modergång längs fiberriktningen. Där lägger hon ägg efter ägg. Larverna gnager sig sedan ut vinkelrätt mot modergången. Efter ca 5

cm viker en del larvgångar av och korsar de andra. Modergången och partier av larvgångarna är lätt nedskurna i ytveden. Spåren syns därför åratals efter att de gjorts och en hackspett hackat bort barken.